


## Behandeling en monitoring



### ACTH-STIMULATIETEST VOOR MONITORING:

Een ACTH-stimulatietest voor de monitoring van de behandeling met Vetoryl® moet uitgevoerd worden 4-6 u na het geven van Vetoryl®. De post-ACTH cortisolwaarde in het bloed moet zich tussen de 50 en 200 nmol/l bevinden. Informeer ook bij uw laboratorium alvorens deze test uit te voeren.





**Vetoryl®** 5/ 10/ 30/ 60/ 120 mg harde capsules voor honden. **Samenstelling:** 5/ 10/ 30/ 60/ 120 mg trilostane per capsule. **Doeldier:** hond. **Indicatie(s):** voor de behandeling van hypofyseafhankelijk en bijnierafhankelijk hyperadrenocorticisme (de ziekte en het syndroom van Cushing). **Contra-indicaties:** niet gebruiken bij dieren die lijden aan een primaire leveraandoening en/of nierinsufficiëntie. Niet gebruiken bij honden met een gewicht van minder dan 3 kg. Niet gebruiken bij bekende gevallen van overgevoeligheid voor de werkzame stof of één van de hulpstoffen. **Dosering en toedieningsweg:** voor oraal gebruik. De startdosering voor de behandeling is ongeveer 2 mg/kg, gebaseerd op beschikbare combinaties van capsulegroottes. Eénmaal daags met voeding toedienen. Bepaal de dosis naargelang de individuele respons door middel van monitoring. Indien een dosisverhoging nodig is, gebruik dan combinaties van capsules om de dosis, die één maal per dag wordt verstrekt, langzaam te verhogen. Dien de laagst mogelijke dosering toe om klinische symptomen onder controle te houden. Verdeel of open de capsules niet. **Bijwerkingen:** een corticosteroïddervingssyndroom of hypocortisolemie moet onderscheiden worden van hypoadrenocorticisme door een evaluatie van de elektrolyten in het serum. Symptomen geassocieerd met iatrogeen hypoadrenocorticisme, inclusief zwakte,

lethargie, anorexia, braken en diarree kunnen zich voordoen, vooral wanneer de monitoring niet adequaat is. De symptomen zijn doorgaans omkeerbaar na het stopzetten van de behandeling. Een acute crisis van de ziekte van Addison kan zich voordoen. Lethargie, braken, diarree en anorexia zijn waargenomen bij honden behandeld met trilostane in afwezigheid van aangetoond hypoadrenocorticisme. Een subklinische renale disfunctie of artritis kan door de behandeling onthuld worden. Andere zeldzame bijwerkingen zijn ataxie, hypersalivatie, tympanie van de digestietractus, spiertremor, veranderingen van de huid, adrenale necrose, plotselinge dood. **Speciale voorzorgsmaatregelen:** trilostane kan de synthese van testosteron verminderen en heeft anti-prostagene eigenschappen. Vrouwen die zwanger zijn of zwanger willen worden, moeten het hanteren van de capsules vermijden. Was de handen met zeep en water na accidentele blootstelling en na gebruik. **Dracht en lactatie:** niet gebruiken bij drachtige of zogende teven of bij fokdieren. **Bewaarschrift:** bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht. **REG NL:** REG NL 126085 | REG NL 10348 | REG NL 10357 | REG NL 10358 | REG NL 10359 UDA. © 2021 Dechra Veterinary Products, Wilgenweg 7, 3421 TV Oudewater.



Dechra | Wilgenweg 7 | 3421 TV Oudewater  
T. (0)348 563 434 | E info.nl@dechra.com | www.dechra.nl

  
**Dechra**